



Humane Society of Utah
4242 South 300 West
Murray, UT 84107
801-261-2919 ext. 230
clinic@utahhumane.org

Calendario de Vacunación Recomendado Para Gatitos

Fecha Dada: **1st Set (8 semanas): \$35** (con desparasitación gratuita)

- Primer FVRCP (*Feline Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia, Chlamydophila*)
- Primer Desparasitante (*Pyrantel for Roundworm*)

Fecha Dada: **2nd Set (12 semanas): \$60** (con descuento de paquete de \$20 y desparasitación gratis)

- Segundo FVRCP
- Primer FeLV (*Feline Leukemia*)
- Segundo Desparasitante

Fecha Dada: **3rd Set (16 semanas): \$70** (con un descuento de paquete de \$30)

- Tercer FVRCP
- FeLV Anual
- Rabia de 1 año

- Recomendado implante de microchip \$40
- Programar esterilización/castración

Las vacunas iniciales para gatitos deben administrarse cada 3 o 4 semanas, comenzando a las 8 semanas de edad hasta que el gatito alcance al menos las 16 semanas de edad. Se debe proporcionar un mínimo de tres juegos de FVRCP.

El número total de juegos necesarios dependerá completamente de la edad del gatito en cada visita. Para minimizar el costo, los tutores pueden traer a su gatito exactamente a las 8, 12 y 16 semanas de edad.

Si las series se administran con un intervalo de más de 4 semanas, serán necesarias vacunas adicionales a cargo del tutor. Si los gatitos comienzan sus vacunas antes de las 8 semanas de edad o completan la serie anterior antes de cumplir las 16 semanas, serán necesarias vacunas adicionales a cargo del dueño.

El costo es de \$35 por cada FVRCP adicional necesario.

Los gatitos de 16 semanas en adelante requieren dos series de FVRCP administradas con 3 a 4 semanas de diferencia. Las vacunas incluidas en el conjunto final tienen una vigencia de un año. Cuando regresen un año después, se les dará un FVRCP y Rabia que será válido por tres años.

La vacuna contra el virus de la leucemia felina debe administrarse a TODOS los gatos menores de un año. FeLV requiere un refuerzo 3-4 semanas después de la inmunización inicial, luego un refuerzo anual para gatos con alto riesgo de exposición (normalmente gatos que pasan tiempo al aire libre).

Todos los gatos y conejos deben estar en transportines ventilados.