



Humane Society of Utah
4242 South 300 West
Murray, UT 84107
801-261-2919 ext. 230
clinic@utahhumane.org

Calendario de Vacunación Recomendado Para Cachorros

Fecha Dada: **1er Set (8 semanas): \$40** (con desparasitación gratuita)

- Primer DA2PP (Distemper, Adenovirus Type 2, Parvovirus, Parainfluenza)
- Primer Desparasitante (Pyrantel for Roundworm)

Fecha Dada: **2do Set (12 semanas): \$55** (con descuento de paquete de \$15 y desparasitación gratis)

- Segundo DA2PP
- Bordetella Intranasal Anual (Tos de perrera)
- Segundo Desparasitante

Fecha Dada: **3er Set (semanas): \$50** (con un descuento de paquete de \$10)

- DA2PP Anual
- Rabia de 1 año

- Iniciar "vacunas de estilo de vida" opcionales: Influenza, Lyme, Leptospirosis
- Recomendado implante de microchip \$40
- Programar esterilización/castración

Las vacunas iniciales para cachorros deben administrarse cada 3 o 4 semanas hasta que el cachorro alcance al menos las 16 semanas de edad. Se debe proporcionar un mínimo de tres juegos de DA2PP.

El número total de juegos necesarios dependerá enteramente de la edad del cachorro en cada visita. Para minimizar sus visitas y el costo para usted, le recomendamos que vacune a su cachorro a las 8, 12 y 16 semanas de edad.

Si las series se administran con un intervalo de más de 4 semanas, serán necesarias vacunas adicionales a cargo del tutor. Si los cachorros comienzan sus vacunas antes de las 8 semanas de edad o completan la serie anterior antes de cumplir las 16 semanas, serán necesarias vacunas adicionales a cargo del tutor.

The cost is \$40 for each additional DA2PP needed.

Los cachorros de 16 semanas en adelante necesitan dos series de DA2PP administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas. Las vacunas incluidas en el conjunto final tienen una vigencia de un año. DA2PP y Rabia estarán vigentes durante tres años después de eso.

La vacuna intranasal contra Bordetella está vigente durante un año y debe repetirse anualmente para proteger a los perros del virus altamente contagioso que se transmite por el aire. La influenza se recomienda para perros que frecuentan parques para perros e instalaciones de internado. La leptospirosis se recomienda para perros que caminan y nadan en la naturaleza debido al riesgo de exposición a la orina de animales salvajes infectados. Lyme se recomienda para perros que caminan y no están en prevención de garrapatas.

Todos los perros, grandes o pequeños, deben llevar correa.